

Cách sử dụng sản phẩm enzyme+probiotics

(Sản phẩm nhập khẩu và phân phối độc quyền từ Advanced Enzymes, Ấn Độ)

1. EnvironSEB cattle

Dùng ủ phân heo, bò, gà, chất thải giàu xơ thành compost (phân hữu cơ giàu dinh dưỡng)

Cách dùng: tỷ lệ dùng 40-50 g (4-5 muỗng cơm) cho 1 m³ chất thải (phân +rác thải hữu cơ như rơm rạ, bã trồng nấm, rác thải nhà bếp, rau củ)

Hòa chế phẩm trong 2 lít nước ấm 40-50 độ C, phun đều lên đống chất thải, đảo đều, thêm nước nếu cần để cho nguyên liệu đống ủ có độ ẩm 60-65%, đậy phủ qua bên ngoài bằng vải bạt hoặc rơm, cỏ, sau 1 tháng có phân compost hoai mục, giảm hẳn mùi hôi.

2. Environ SEB Hog

Dùng chuyên cho xử lý mùi hôi chuồng trại, kênh mương, hồ chứa sinh học

Cách dùng: pha tỷ lệ 10 gam chế phẩm hòa trong 20 lít nước ấm 40-45 độ (đun sôi nước, thêm nước lạnh vào), để 2 giờ sau đó phun lên bề mặt chuồng, vách trại

Nếu dùng cho xử lý kênh mương bốc mùi , dùng tỷ lệ 10-20 gam/ 1m³ nước thải, tùy mức độ ô nhiễm mà dùng tăng hay giảm lượng chế phẩm. Hòa tan chế phẩm vào 1 xô nước, phun đều mặt hồ, kênh mương. Sau hai ngày giảm hẳn mùi hôi.

Cách sử dụng chế phẩm EnviroSEB Universal xử lý chất thải hữu cơ giàu xơ -> compost giàu dinh dưỡng

3. EnviroSEB Universal

Dùng chuyên cho phân giải chất thải giàu xơ, tinh bột, đạm,...và tập hợp Vi sinh vật thuộc nhóm Probiotics.

Cách dùng: Hòa lượng enzym cần thiết với nước phun lên đống chất thải (40 gr/tấn)->, đảo đều, sao cho độ ẩm chất thải đạt 60-70% □ phủ bạt che nắng mưa, sau 10 ngày đảo đều, bổ sung thêm enzym hòa với nước nếu chất thải quá giàu xơ chưa phân hủy (20 gr/tấn), che đậy lại. Sau 20-30 ngày cho sản phẩm là phân compost hoai mục, hết mùi hôi giàu dinh dưỡng hữu cơ và vi sinh vật hữu ích bón cho cây trồng.

Liều lượng: Trung bình 40g/ tấn chất thải, hàm lượng enzym bổ sung sau 10 ngày khi đảo là 20 gr/tấn.

Lưu ý:

Tuyệt đối không dùng vôi trong quá trình ủ xử lý chất thải, vôi làm hỏng hoạt tính xúc tác của enzym.

Tốt nhất bảo quản enzym trong ngăn mát tủ lạnh nếu chưa dùng đến (đọc kỹ tài liệu về enzym gửi kèm)

Lượng Enzym sd nhiều hơn liều lượng hướng dẫn càng tốt, nhưng không thể cho ít hơn. Thời gian ủ càng lâu càng tốt, nhưng không nên để quá 2 tháng, chất dinh dưỡng sẽ mất dần.